

# شیاف ایندومتاسین ۵۰، ۱۰۰ میلی گرم

## مشخصات دارو:

هر شیاف ایندومتاسین حاوی ۵۰ یا ۱۰۰ میلی گرم ماده ی موثره ی ایندومتاسین می باشد. ایندومتاسین از جمله داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی است که باعث کاهش درد و ناراحتی ناشی از التهاب می شود.

## موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا تومیه ی آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

شیاف ایندومتاسین می تواند در موارد زیر توسط پزشک شما تجویز شود:

- آرتريت روماتويد
- استنوز آرتريت
- اسپوندیلیت انکیلوزان (بیماری مزمن روماتیسمی است که موجب درد و محدودیت حرکتی در ستون مهره و لگن میشود.)
- اختلالات عضلانی و اسکلتی
- درد قاعدگی
- کمردرد و درد مفاصل لگن
- تخفیف علائم نقرس حاد

## نحوه و مقدار مصرف دارو:

شیاف را پس از اجابت مزاج مصرف نمایید.

شیاف را از فویل خارج کرده به پهلو بخوابید در حالی که زانوها به داخل شکم خم شده باشند، شیاف را از طریق مقعد داخل نمایید. (شیاف را از سر نوک تیز وارد کنید)

برای مدت ۱ دقیقه از جای خود بلند نشوید. شیاف باید در جای خود باقی مانده و به طور کامل باز شود.

بعد از استعمال، دست هایتان را با آب و مابون شستشو دهید.

## مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو توسط پزشک شما تعیین می شود. دوز معمول یک شیاف است که یک تا دو بار در روز مصرف می شود.

مصرف شیاف ایندومتاسین در کودکان زیر ۱۴ سال توصیه نمی شود.

## موارد منع مصرف:

در صورت وجود شرایط زیر از مصرف شیاف ایندومتاسین خودداری نمایید:

- حساسیت به ماده ی موثره ی دارو (ایندومتاسین)
- سابقه ی زخم معده یا دوازدهه، خونریزی فعال معده
- سابقه ابتلا به خونریزی مقعدی

## هشدارها و احتیاطات:

از مصرف دارو در بیماران مبتلا به زخمهای گوارشی فعال یا یا سابقه ابتلا به زخمهای راجعه گوارشی خودداری شود. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر ایندومتاسین می توانند باعث نارسایی قلبی و عروقی، کبدی و کلیوی گردند. لذا در این بیماران مصرف اینگونه داروها با احتیاط صورت گیرد.

## هشدارها:

داروهایی مانند ایندومتاسین می توانند با افزایش ریسک حمله ی قلبی (سکته ی قلبی) یا سکته ی مغزی همراه باشند که با افزایش دوز و دوره ی درمان این ریسک افزایش می یابد. از افزایش دوز مصرفی بدون نظر پزشک خودداری نمایید.

## بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی و بارداری توصیه نمی گردد.

## تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.

ایندومتاسین می تواند با داروهای ذیل تداخل داشته باشد:

- آسپیرین یا داروهای دیگری از دسته ضدالتهاب های غیر استروئیدی
- داروهای ضد انعقاد خون

متوترکسات (که در درمان سرطان، بیماری های پوستی و آرتريت روماتويد به کار می رود)

- سیکلوسپورین
- لیتیم در درمان بیماری های اعصاب
- داروهای مدر، دیگوکسین در درمان نارسایی قلبی، داروهای ضد فشار خون
- داروی پروبنسید در درمان نقرس
- میفنبريستون
- فنیل پروپرانول آمین در داروهای ضداحتقان بینی

## عوارض جانبی:

مانند همه ی دارو های دیگر، شیاف ایندومتاسین می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد، گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند.

این موارد شامل:

سردرد، خواب آلودگی، بیحالی، احساس خستگی، افزایش احتمال بروز حملات صرع، تحریک مقعدی، التهاب موکوس و یا ایجاد زخم گوارشی همراه با خونریزی، عوارض کبدی و کلیوی، ایجاد واکنشهای ازدیاد حساسیتی و شوک آنافیلاکتیک در بیماران حساس به دارو.

## شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

