

لیزینوپریل / هیدروکلروتیازید

قرص های لیزونکس - اچ ۱۰-۱۲/۵ میلی گرمی حاوی ۱۰ میلی گرم لیزینوپریل و ۱۲/۵ میلی گرم هیدروکلروتیازید و قرص های ۲۰-۲۵ میلی گرمی حاوی ۲۰ میلی گرم لیزینوپریل و ۲۵ میلی گرم هیدروکلروتیازید می باشند.

دسته دارویی

ضد فشارخون ؛ گشاد کننده عروق؛ مدر

موارد مصرف

فشار خون بالا در بیمارانی که درمان ترکیبی برای آنها مناسب است.

تداخلات دارویی

مکمل های پتاسیم، عوامل نگهدارنده پتاسیم یا جایگزین های حاوی نمک پتاسیم، لیتیم، طلا، داروهای ضد فشار خون، ضد دیابتها، ایندومتاسین و NSAIDها (داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی).

موارد منع مصرف

لیزینوپریل / هیدروکلروتیازید در بیمارانی که مشکل در دفع ادرار دارند، به یکی از اجزای محصول و یا به مشتقات سولفونامیدی حساسیت دارند، و یا در افرادی که دچار آنژیوادم ارثی و یا ایدیو پاتیک، ادم عروقی-عصبی مربوط به داروهای مهار کننده ACE می باشند منع مصرف دارد. همچنین استفاده از لیزینوپریل / هیدروکلروتیازید در دوران بارداری منع مصرف دارد.

موارد هشدار و احتیاط

- افت فشار خون، کاهش الکترولیتها و حجم مایعات بدن همزمان با مصرف سایر داروهای فشار خون.
- جراحی / بیهوشی
- در جراحی های بزرگ یا در طی بیهوشی با داروهایی که ایجاد افت فشار خون می کنند، با احتیاط مصرف گردد.
- اختلال کلیوی
- هیدروکلروتیازید در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیوی، به عنوان یک دیورتیک مناسب نمی باشد.
- بیماری کبد
- هیدروکلروتیازید می بایست در بیماران با اختلال عملکردی کبد یا بیماری های پیشرفته کبدی با احتیاط استفاده گردد.
- حساسیت/ آنژیوادم
- در بیماران تحت درمان با مهارکننده های ACE که دچار ادم صورت، اندام، لب ها، زبان، دهانه حنجره و حنجره می باشند، با احتیاط مصرف گردد.
- درمان های تیزایدی ممکن است تحمل گلوکز را مختل کند. با مصرف مهارکننده های ACE هیپوگلیسمی مشاهده شده است.
- بیماران تحت دیالیز
- مکمل های پتاسیم و دیورتیکهای نگهدارنده پتاسیم با احتیاط مصرف شود.
- سرفه
- سرفه در ارتباط با استفاده از مهار کننده های ACE گزارش شده است.

مصرف در حاملگی و شیردهی:

رده بارداری C در سه ماهه اول بارداری و رده بارداری D در سه ماهه دوم و سوم بارداری؛ مطالعات کافی و کنترل شده در مورد اثرات این دارو در دوران بارداری انجام نشده است.
در طی بارداری، لیزینوپریل/هیدروکلروتیازید منع مصرف دارند، در صورت باردارشدن، درمان جایگزین می بایستی در اسرع وقت آغاز گردد.

شیردهی

ترشح لیزینوپریل به شیر انسان مشخص نشده است. تیزایدها درون شیرترشح می شوند بنابراین در شیردهی با احتیاط مصرف گردد.

عوارض جانبی

سرگیجه ، سر درد، پarestزی، افت فشار خون از جمله افت فشار خون وضعیتی، سنکوپ ، اسهال، تهوع، استفراغ، خارش، گرفتگی عضلانی، ناتوانی جنسی ، خستگی ، ضعف، افزایش سطح اوره درخون، افزایش کراتینین سرم، افزایش آنزیمهای کبدی، کاهش هموگلوبین، آریتمی، اختلالات کلیوی و تب.

مقدار و نحوه مصرف دارو

در موارد خفیف، یک قرص از لیزینوپریل/ هیدروکلروتیازید (۱۰ میلی گرم - ۱۲/۵ میلی گرم) یک بار در روز تجویز می شود. مانند همه داروهایی که یکبار در روز تجویز می شوند، لیزینوپریل/ هیدروکلروتیازید (۱۰ میلی گرم - ۱۲/۵ میلی گرم) نیز ترجیحا می بایست در یک زمان مشخص در هر روز مصرف گردد. لیزینوپریل/ هیدروکلروتیازید (۱۰ میلی گرم - ۱۲/۵ میلی گرم) می تواند با غذا یا بدون غذا مصرف گردد. اگر اثر درمانی مورد نظر در طی دو تا چهار هفته حاصل نشد، می توان دوز را به صورت دو قرص لیزینوپریل/ هیدروکلروتیازید (۱۰ میلی گرم - ۱۲/۵ میلی گرم) تغییر داد.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید . هر ۱۰ عدد قرص (از هر دوز) در یک بلیستر و هر ۳ بلیستر همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی قرار دارد.

