



قرص جویدنی مونتکس® ۵ میلی گرم (مونته لوکاست)
قرص روکشدار مونتکس® ۱۰ میلی گرم

یادآوری:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

دوره درمان را کامل کنید.

مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد.

چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این دارو به نظرتان رسید، با پزشک یا داروساز خویش تماس بگیرید.

ترکیب: هر قرص جویدنی مونتکس® ۵ حاوی ۵ میلی گرم مونته لوکاست سدیم، هر قرص روکشدار مونتکس® ۱۰ حاوی ۱۰ میلی گرم مونته لوکاست سدیم.

راهنمایی های عمومی:

لازم است قبل از مصرف این دارو چنانچه بیمار دارای هر یک از شرایط زیر می باشد، پزشک خویش را مطلع سازد:

سابقه حساسیت به این دارو.

سابقه اختلالات عملکرد کبدی.

مصرف در بارداری:

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در حاملگی جزء گروه B قرار داده است. مصرف این دارو تنها با نظر پزشک در بارداری مجاز است.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی باشد، منافع و مضار احتمالی ناشی از استفاده از این دارو در دوران شیردهی باید در نظر گرفته شود.

موارد احتیاط:

مصرف این دارو در بیمارانی که اختلالات شدید عملکرد کبدی دارند باید با احتیاط همراه باشد.

نباید از این دارو به طور ناگهانی به عنوان جایگزین داروهای استنشاقی و یا خوراکی کورتیکواستروئیدی استفاده کرد.

از این دارو نمی توان به عنوان درمان منحصر در بیمارانی که پس از فعالیت دچار حملات آسمی می شوند استفاده نمود، بلکه این بیماران باید برای جلوگیری از بدتر شدن بیماری خود به مصرف رژیم های درمانی معمول خود شامل بتاگونیسست های استنشاقی و یا خوراکی ادامه دهند.

توصیه می شود بیمارانی که دارای سابقه حساسیت به A.S.A و سایر NSAIDs می باشند علی رغم بهبود عملکرد تنفسی خود پس از مصرف مونتکس®، همچنان از مصرف این داروها اجتناب نمایند.

از آنجایی که قرص جویدنی مونتکس® حاوی فنیل آلانین می باشد، مصرف این دارو در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری باید با احتیاط همراه باشد.

همچنین مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها دارای تداخل دارویی می باشد، لذا چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

مصرف همزمان این دارو با فنوباریتال و ریفامپین (به علت افزایش متابولیسم کبدی مونته لوکاست) دارای تداخل دارویی می باشد.

مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمون های عملکرد کبدی (ALT, AST) و اتوزینوفیل ها می گردد.

به استثناء موارد خاص که پزشکتان لازم می داند، این دارو در موارد زیر منع استعمال دارد:

حساسیت به مونته لوکاست و یا هر یک از اجزاء متشکله.

توجه: از این دارو نباید جهت درمان فوری علایم حملات حاد آسمی استفاده نمود. به این بیماران توصیه می شود داروهای استنشاقی ضروری برای کنترل این حملات را همیشه در دسترس داشته باشند.

مقدار و نحوه مصرف:

این دارو را دقیقاً مطابق شیوه ای که پزشکتان دستور داده استفاده نمایید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

قرص جویدنی ۵ میلی گرمی مونتکس® برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن برای افراد ۱۵ تا ۱۶ سال به صورت تک دوز ابتدای شب، و برای بهبود علایم رینیت آلرژیک ۵ میلی گرم تک دوز تجویز می شود.

برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن در بزرگسالان، قرص ۱۰ میلی گرمی مونتکس® به صورت تک دوز ابتدای شب، و برای بهبود علایم رینیت آلرژیک ۱۰ میلی گرم تک دوز توصیه می شود.

برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن در کودکان ۵ تا ۱۲ سال قرص جویدنی ۵ میلی گرمی مونتکس® به صورت تک دوز ابتدای شب.

برای پیشگیری و درمان بیماری آسم مزمن در کودکان ۱۲ تا ۳۲ ماه قرص جویدنی ۵ میلی گرمی مونتکس® به صورت تک دوز.

توجه: سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو برای پیشگیری و درمان آسم در کودکان زیر ۱۲ ماه و برای بهبود علایم رینیت آلرژیک در کودکان زیر ۶ ماه ثابت نشده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف لازم است به نکات زیر توجه نمایید:

هرگز از مقدار تجویز شده توسط پزشک تجاوز ننمایید.
این دارو را می توان با معده خالی یا همراه غذا مصرف نمود.
در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از:

عوارضی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

شیوع کم: افزایش بدون علامت آنزیم های عملکرد کبدی (ALT, AST)
نادر: وجود عفونت در ادرار.

عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

شایع: سردرد.

شیوع کم: دردهای شکمی، احساس کوفتگی، سرفه، دندان درد، اختلال در تعادل، سوء هاضمه، تب، التهاب معده و روده، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، گرفتگی بینی، علائم شبه آنفولانزا، راش پوستی، بی قراری، واکنش های حساسیتی (ورم صورت، لب ها، زبان و گلو) کهیر و خارش، کابوس های شبانه، کبودی، اسهال، خواب آلودگی، توهم، هیپاتیت، التهاب پانکراس، زود رنجی، درد مفاصل و ماهیچه ها، تهوع و استفراغ، تپش قلب، احساس کرختی و سوزن سوزن شدن پاها و دست ها، تشنج و اختلال در خواب.

مسمومیت با دوزهای بیش از اندازه:

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل نمایید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته جداً خودداری فرمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

نوع بسته بندی:

هر جعبه ۱۰ عددی قرص روکشدار مونتکس[®] ۱۰ حاوی یک بلیستر می باشد
و هر جعبه ۳۰ عددی قرص جویدنی مونتکس[®] ۵ حاوی سه بلیستر می باشد.

مصرف کننده محترم: از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی

ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن: ۷۷۷۱۵۵۵۴

از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.