

# شیاف ناپروکسن

۵۰۰ میلی گرم

## مشخصات دارو:

هر شیاف ناپروکسن حاوی ۵۰۰ میلی گرم ماده موثره ی ناپروکسن می باشد. ناپروکسن از جمله داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی است که باعث کاهش درد و ناراحتی ناشی از التهاب می شود.

## موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه ی آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

شیاف ناپروکسن می تواند در موارد زیر توسط پزشک شما تجویز شود:

- آرتريت روماتوييد
- استنواآرتريت
- اختلالات عضلانی و اسکلتی
- درد قاعدگی
- کمردرد و درد مفاصل لگن
- تخفيف علائم نقرس حاد

## نحوه و مقدار مصرف دارو:

شیاف را پس از اجابت مزاج مصرف نمایید.

شیاف را از فویل خارج کرده به پهلو بخوایید در حالی که زانوها به داخل شکم خم شده باشند، شیاف را از طریق مقعد داخل نمایید. (شیاف را از سر نوک تیز وارد کنید)

برای مدت ۱ دقیقه از جای خود بلند نشوید. شیاف باید در جای خود باقی مانده و به طور کامل باز شود. دستانتان را بشویید.

## مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو توسط پزشک شما تعیین می شود. دوز معمول یک شیاف یک تا دو بار در روز مصرف می شود.

مصرف شیاف ناپروکسن در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.

## موارد منع مصرف:

در صورت وجود شرایط زیر از مصرف شیاف ناپروکسن خودداری نمایید:

- حساسیت به ماده ی موثره ی دارو (ناپروکسن)
- سابقه ی زخم معده یا دوازدهه ،خونریزی فعال معده
- سابقه ابتلا به پروکتیت یا خونریزی مقعدی

## هشدارها و احتیاطات:

از مصرف دارو در افراد با سابقه حساسیت به آسپرین و سایر داروهای NSAIDS (مانند ایبوپروفن،کتورولاک و ..) و افراد با مشکلات انعقادی وسابقه خونریزی خودداری شود.

از مصرف دارو در بیماران مبتلا به زخمهای گوارشی فعال یا با سابقه ابتلا به زخمهای راجعه گوارشی خودداری شود.

افراد با سابقه خونریزی از مقعد یا رکتوم و افراد دارای ضایعه التهابی در مقعد یا رکتوم از مصرف شیاف ناپروکسن باید اجتناب کنند.

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی نظیر ناپروکسن می توانند باعث نارسایی قلبی و عروقی، کبدی و کلیوی گردند. لذا در این بیماران مصرف اینگونه داروها با احتیاط صورت گیرد.

داروهایی مانند ناپروکسن می توانند با افزایش ریسک حمله ی قلبی (سکته ی قلبی) یا سکته ی مغزی همراه باشند که با افزایش دوز و دوره ی درمان این ریسک افزایش می یابد.

از افزایش دوز مصرفی بدون نظر پزشک خودداری نمایید.

## بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی و بارداری(خصوصا سه ماهه سوم بارداری) توصیه نمی گردد.

## تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.

ناپروکسن می تواند با داروهای ذیل تداخل داشته باشد:

- آسپرین یا داروهای دیگری از دسته ضدالتهاب های غیر استروئیدی
- داروهای ضدانعقاد خون مانند وارفارین ،هپارین
- متوترکسات (که در درمان سرطان، بیماری های پوستی و آرتريت روماتوييد به کار می رود)
- سیکلوسپورین
- لیتیموم در درمان بیماری های اعصاب
- داروهای مدر، دیگوکسین در درمان نارسایی قلبی، داروهای ضد فشار خون
- داروی پروبنسید در درمان نقرس
- میفپریستون
- فنیل پروپرانول آمین در داروهای ضداحتقان بینی

## عوارض جانبی:

مانند همه ی دارو های دیگر، شیاف ناپروکسن می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد، گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند.

## این موارد شامل:

سردرد، خواب آلودگی، بی حالی، احساس خستگی، تحریک مقعدی، التهاب موکوس و یا ایجاد زخم گوارشی همراه با خونریزی، عوارض کبدی و کلیوی، تغییر رنگ ادرار و مدفوع،تاری دید،درد قفسه سینه ،تنگی نفس، ایجاد واکنشهای ازدیاد حساسیتی در بیماران حساس به دارو.

## شرایط نگهداری دارو:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

