

قرص روکش دار لیزونکس

لیزینوپریل (۲۰ میلی گرم)

هر قرص لیزونکس حاوی ۲۰ میلی گرم ماده مؤثره لیزینوپریل می باشد

دسته دارویی:

واژودیلاتور و ضد فشار خون از دسته ACEI (مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین)

موارد مصرف:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید .

۱. به تنهایی یا همراه با یک داروی دیورتیک (تیازید) برای درمان فشار خون .
۲. برای درمان نارسایی احتقانی قلب (CHF) (به همراه داروهای دیورتیک یا دیجیتال یا بتابلکارها)
۳. ۲۴ ساعت پس از انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران که از لحاظ همودینامیک ثابت شده اند .
۴. درمان نارسایی کلیه در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ با فشار خون بالا

مقدار و نحوه مصرف دارو:

۱. مقدار و نحوه مصرف دارو را پزشک تعیین می نماید . از مصرف دارو در موارد مشابه و به مقدار دلخواه و دفعات بیشتر و مدت طولانی تر خودداری نمایید .

۲. به منظور رسیدن به اثرات مطلوب درمانی دارو را هر روز سر ساعت میل کرده و در صورت فراموش شدن یک دوز دارو به محض به یاد آوردن ، آنرا مصرف کنید و اگر نزدیک به دوز مصرف بعدی است ، دوز قبلی را نخورده و از دوبرابر کردن دوز خودداری نمایید.

۳. از قطع سرخود و ناگهانی دارو بپرهیزید .

نحوه تجویز در بزرگسالان

۱. درمان فشار خون بالا:
 - شروع درمان: ۱۰ میلی گرم در روز
 - درمان نگهدارنده: ۲۰ - ۴۰ میلی گرم در روز
 - حداکثر میزان مصرف: ۸۰ میلی گرم در روز
۲. نارسایی احتقانی قلب (CHF)
 - به همراه داروهای دیورتیک یا دیجیتال یا بتابلکارها
 - شروع درمان: ۵-۲/۵ میلی گرم در روز
 - درمان نگهدارنده: ۵ تا ۳۵ میلی گرم در روز (تعیین دوز مصرفی با توجه به شرایط بیمار)
 - حداکثر میزان مصرف: ۴۰ میلی گرم در روز
۳. انفارکتوس حاد میوکارد
 - شروع درمان: ۵ میلی گرم ۲۴ ساعت بعد از حمله قلبی
 - ادامه درمان: ۵ میلی گرم بعد از ۲۴ ساعت، سپس ۱۰ میلی گرم بعد از ۴۸ ساعت
 - درمان نگهدارنده: ۱۰ میلی گرم در روز (باید حداقل ۶ هفته ادامه یابد)
 - ۴. نفروپاتی دیابتیک
 - شروع درمان: ۱۰-۲۰ میلی گرم در روز
 - درمان نگهدارنده: ۲۰-۴۰ میلی گرم در روز
 - افزایش دوز دارو باید هر ۳ روز باشد.

نحوه تجویز در سالمندان:

درمان فشار خون بالا:

- شروع درمان: ۵-۲/۵ میلی گرم در روز
- درمان نگهدارنده: افزایش دوز دارو به صورت ۲/۵-۵ میلی گرم در روز در طی ۱ تا ۲ هفته.
- حداکثر میزان مصرف: ۴۰ میلی گرم در روز

نحوه تجویز در کودکان:

درمان فشار خون بالا:

- قابل تجویز در کودکان ۶ ساله یا بزرگتر از ۶ سال
- شروع درمان: ۰/۷-۵ میلی گرم به ازای هر کیلو وزن در روز - حداکثر میزان مجاز: ۵ میلی گرم در روز
- درمان نگهدارنده: افزایش دوز دارو در طی ۱ تا ۲ هفته تا مشاهده اثرات مطلوب
- حداکثر میزان مصرف: مقدار بیشتر از ۱/۶ میلی گرم به ازای هر کیلو وزن در روز یا بیشتر از ۴۰ میلی گرم در روز در کودکان

مورد مطالعه قرار نگرفته است.

مصرف در بارداری

اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید پزشک خود را مطلع کنید. مصرف این دارو بعد از ماه سوم بارداری می تواند آسیب های جدی به جنین وارد کند.

مصرف در دوران شیردهی

اگر در دوران شیردهی هستید پزشک خود را مطلع کنید. این دارو برای مادران شیرده توصیه نمی شود و ممکن است پزشک شما در مان دیگری را جایگزین کند.

موارد منع مصرف:

۱. حساسیت به لیزینوپریل یا سایر داروهای ACEI (مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین)
۲. سابقه آنژیوادم (علائم: تورم صورت ، تورم در اندام انتهایی ، سختی در بلع و تنفس) ناشی از مصرف داروهای ACEI در بیمار یا یکی از اعضای خانواده
۳. سابقه آنژیوادم شدید با دلیل ناشناخته
۴. دوران بارداری (بعد از ماه سوم بارداری)

ه. دوران شیردهی

موارد هشدار و احتیاط:

۱. در صورتیکه یکی از علائم تورم صورت ، تورم در اندام انتهایی(دست ها، پاها، زانوها) ، سختی در بلع و تنفس بوجود آمد ، برای جلوگیری از خطر آنژیوادم با پزشک خود مشورت نمایید .
۲. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :
 - حساسیت به هر کدام از داروهای ACEI (مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین) .
 - در صورت داشتن فشار خون پایین که می تواند با احساس سرگیجه و سبکی سر، مخصوصاً در وضعیت ایستاده همراه باشد.
 - اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید، این دارو میتواند به جنین آسیب برساند.
 - اگر اخیراً دچار اسهال یا تهوع شده اید.
 - اگر هم اکنون سرفه های خشک دارید.
- اگر میزان کلسترول در خون شما زیاد است و از داروهای کاهشنده LDL مانند استاتین ها استفاده می کنید.
- مصرف همزمان دیورتیک ها (مخصوصاً نگهدارنده های پتاسیم) ، سایر داروهای نگهدارنده پتاسیم یا مکمل های سدیم و پتاسیم.

• آنژیوادم ناشی از مصرف قبلی ACEI ها.

• نارسایی کلیه و کبد ، هایپرکالمی، گرفتگی عروق کلیه ، پیوند کلیه یا دیالیز.

• از دست دادن حجم زیادی از خون.

• مصرف مشروبات الکلی.

• اگر در رژیم غذایی شما مصرف نمک محدود شده است.

۳. به دلیل احتمال وجود خواب آلودگی در حین مصرف این دارو به هنگام رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، احتیاط نمایید.

۴. در صورت لزوم هر نوع عمل جراحی (حتی جراحی های مربوط به دندان) یا درمان های اورژانسی پزشک یا دندانپزشک خود را از مصرف لیزینوپریل مطلع کنید.

۵. به هنگام ورزش یا مواجه شدن با هوای گرم احتیاط کنید (به دلیل تعریق زیاد ، ریسک دهیدراته شدن بدن و در نتیجه افت فشار خون وجود دارد)

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود .

عوارض جانبی شایع:

- سردرد و سرفه خشک و مقاوم ، کاهش فشار خون وضعیتی با علائم سرگیجه و سبکی سر ، اسهال، تهوع و نقص در عملکرد کلیه
- سایر عوارض:
 - ضربان قلب نامنظم ، راش پوستی همراه یا بدون خارش ، آبریزش بینی، درد در ناحیه شکم، کاهش توان ماهیچه ها، افزایش آنزیم های کبدی، افزایش میزان پتاسیم خون ، خستگی مفرط و احساس خواب آلودگی
 - به ندرت ممکن است واکنش آلرژیک (تورم صورت ، لبها و گردن ، مشکل در تنفس و راش) ، تاول ، خونریزی از لب، چشم ، دهان، بینی یا ناحیه ریزتال مشاهده شود در این صورت باید دارو قطع گردد و به مراکز درمانی مراجعه شود.

تداخل دارویی:

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.

بعضی دارو ها می توانند با قرص لیزینوپریل تداخل داشته باشند که شامل موارد زیر می باشد:

الکل ، الواسارتان و لوزارتان، پتاسیم فسفات تزریقی ، داروهای خوراکی و تزریقی کاهشنده قند خون ، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی (NSAID) مخصوصاً ایندومتاسین ،سیکلوکسیپورین عوامل سایتوتستاتیک، آلوپورینول، پروکائین آمید وکوآرینکواستروئید های سیستمیک و دپرس کننده های مغز استخوان، لیتیم

شرایط نگهداری:

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

• از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .

• دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

ساخت شرکت داروسازی **ابوریحان** (سهامی عام)



black

235 mm