

مزالون®

مزالزین

قرص های خوراکی ایتریک کولد ۵۰۰ و ۸۰۰ میلی گرم

شیاف های ۵۰۰ میلی گرم

دسته دارویی:

داروهای ضد التهاب

موارد مصرف:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید. مزالزین برای درمان کولیت اولسراتیو (یک بیماری که باعث تورم و زخم در جدار روده بزرگ و رکتوم می شود) و همچنین برای حفظ بهبود علائم کولیت اولسراتیو استفاده می شود.

موارد منع مصرف:

• واکنشهای حساسیت شدید نسبت به مزالزین، سالیسیلات ها (آسپرین) یا آمینوسالیسیلات ها ، سولفاسالازین یا سایر اجزا دارو

در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در حاملگی و شیردهی:

گروه مصرف بارداری: نایاب؛

هیچ مطالعه کافی و کنترل شده در زنان باردار وجود ندارد. مصرف این دارو در دوران بارداری بایستی حتما با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضرات آن باشد و بایستی هنگامی مصرف شود که به طور واضح نیازمند مصرف آن باشیم ومنفعت دارو مهمتر از خطر آن باشد.

شیردهی: مزالزین در شیر انسان ترشح می شود. اگر نوزاد دچار اسهال شود، شیردهی را قطع کنید و با احتیاط استفاده کنید. منفعت دارو برای مادر باید مهمتر از ریسک خطر برای نوزاد باشد. مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی فقط با دستور پزشک انجام گیرد .

موارد هشدار و احتیاط:

• اختلال کلیوی

اختلال کلیوی، از جمله حداقل تغییر نفریوتی و نارسایی کلیه، در بیماران مصرف کننده داروهای مزالزین گزارش شده است. توصیه می شود که بیماران ارزیابی عملکرد کلیه را قبل از آغاز مزالزین و در طول دوره درمان به صورت دوره ای انجام دهند.

• سندرم حاد عدم تحمل ناشی از مزالزین

علائم این بیماری شامل اسپاسم، درد شکم، اسهال خونی، گاهی اوقات تب، سردرد و راش می باشد. مشاهده بیماران از نزدیک برای بدتر شدن این مشکل در طول درمان باید انجام گردد. اگر به سندرم عدم تحمل حاد مشکوک است، به سرعت درمان با مزالزین را قطع کنید.

• واکنش های حساسیتی

بعضی از بیماران که یک واکنش حساسیت به سولفاسالازین را تجربه کرده اند ممکن است یک واکنش مشابه به مزالزین یا ترکیبات دیگر که حاوی و یا به مزالزین تبدیل می شوند را داشته باشند. در هنگام درمان بیمارانی که به داروی سولفاسالازین حساسیت دارند باید جوانب احتیاط را رعایت کرد.

واکنشهای حساسیت قلبی ناشی از مزالزین (میوکاردیت و پریکاردیت) با مزالزین گزارش شده است. در تجویز این دارو به بیماران مبتلا به این شرایط باید احتیاط شود.

• نارسایی کبدی

در بیمارانی با سابقه بیماری کبدی بعد تجویز مزالزین گزارش هایی از نارسایی کبدی وجود داشته است. تجویز مزالزین در بیماران کبدی باید با احتیاط باشد.

• انسداد دستگاه گوارش

انسداد در دستگاه گوارش فوقانی ممکن است باعث احتیاط طولانی مدت مزالزین در معده شود که خودآرادسازی مزالزین در روده بزرگ را به تأخیر می اندازد.

• شکل دارویی شیاف فقط برای استعمال مقعدی می باشد .

تداخلات دارویی

استفاده همزمان از مزالزین با عوامل نفروتوکسیک از جمله داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) ممکن است خطر ابتلا به عوارض کلیوی را افزایش دهد.

• آرتیوپورین یا ۶-merkaptopurین: استفاده همزمان از مزالزین با آرتیوپورین یا ۶-merkaptopurین خطر ابتلا به اختلالات خونی را افزایش می دهد.

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

خوراکی

درمان خفیف تا متوسط به کولیت اولسراتیو نسبتاً فعال

بزرگسالان

دور معمول:

برای دوز ۸۰۰ میلی گرم: ۸۰۰ میلی گرم سه بار در روز با غذا یا بدون غذا (کل روزانه ۲۴ گرم)، به مدت ۶ هفته

برای دوز ۵۰۰ میلی گرم: ۱ گرم ۴ بار در روز به مدت ۸ هفته

دوز نگهدارنده:

برای دوز ۸۰۰ میلی گرم: ۱٫۶ گرم در روز، در دو دوز منقسم، به مدت ۶ ماه

برای دوز ۵۰۰ میلی گرم: ۱ گرم ۴ بار در روز به مدت ۸ هفته

• اطفال

برای بیماران اطفال ۵ سال و بالاتر، کل دوز توصیه شده از مزالزین بر اساس وزن است (تا حداکثر ۲٫۴ گرم / روز) منقسم در دو دوز روزانه به مدت ۶ هفته

دوز اطفال براساس وزن

| گروه وزنی (کیلوگرم) | روزانه مقدار مصرف (میلی گرم) / کیلوگرم / روز | حداکثر مقدار روزانه (کیلوگرم / روز) | دوز مسبحگاهی | دوز بعد از ظهر |
|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ۱۷-۲۳ | ۳۴-۷۱ | ۱/۲ | ۲ قرص ۴۰۰ میلی گرمی | یک قرص ۴۰۰ میلی گرمی |
| ۲۳-۵۴ | ۳۷-۶۱ | ۲ | ۳ قرص ۴۰۰ میلی گرمی | ۲ قرص ۴۰۰ میلی گرمی |
| ۵۴-۹۰ | ۴۷-۴۴ | ۲/۴ | ۳ قرص ۴۰۰ میلی گرمی | ۳ قرص ۴۰۰ میلی گرمی |

مقعدی

درمان خفیف تا متوسط اولسراتیو نسبتاً فعال

دوز معمول: یک شیاف رکتال یک بار در روز در زمان خواب

در صورت امکان ،شیاف بهتر است برای یک تا سه ساعت یا بیشتر باقی بماند. سایر معمول درمان سه تا شش هفته بسته به علائم می باشد.

اگر بیمار یک دوز از مزالزین را فراموش کند،به محض یادآوری باید آن را استفاده کند، مگر اینکه تاوقعت نوبت بعدی وقت کمی مانده باشد. بیماران نباید دو شیاف مزالزین را هم زمان باهم جهت جبران دوز از دست رفته استفاده کنند. مصرف این دارو ممکن است باعث ایجاد لکه روی لباس زیر گردد .

• نکات موقع مصرف دارو:

• عملکرد کلیوی را قبل از آغاز مزالزین ارزیابی نمایید.

• قرص مزالزین را همراه یا بدون غذا به طور کامل بلعید. قرص ها را نباید بشکنید یا بجوید.

• قرص های مزالزین را دوز از رطوبت نگهداری ننمایید. ذرب ظرف را محکم و قرص ها را همراه یا کیسه جاذب الرطوبه دردرون ظرف اصلی نگهداری ننمایید.

• سعی کنید قبل از استفاده از شیاف مزالزین روده و مثانه خود را تخلیه کنید .بهترین زمان برای استفاده از این دارو در هنگام خواب است.

نسبت / عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک مشورت کنید:

• دردشکم یا معده درد، سرگیجه ، بزرش مو، سردرد، تهوع، اسهال خونی ، خونریزی از رکتوم ، آنفولانزا، استفراغ، بیوست، سوز، هاضمه ، راش پوستی و نفخ شکم

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

شیاف ها را در جای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت و گرما و درون بسته بندی اصلی نگهداری ننمایید . شیاف ها را در یخچال نگهداری نکنید و از یخ زدگی محافظت ننمایید . قرص ها را در جای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری ننمایید .

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان