

قرص روکشدار ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

دسته‌ی دارویی

سیتاگلیپتین داروی کاهنده ی قند خون است که به تنهایی یا به همراه سایر داروهای ضد دیابت و به همراه اصلاح تغذیه و ورزش در درمان دیابت تیپ ۲ مصرف می شود.

مقدار مصرف دارو

دوز بزرگسالان

روزانه ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز که می تواند همراه یا بدون غذا میل شود.

دوز کودکان

ایمنی و اثربخشی این دارو در بیماران زیر ۱۸ سال تایید نشده است.

تنظیم دوز در نارسایی کلیوی

با توجه به دفع کلیوی دارو در بیماران با نارسایی کلیوی تنظیم دوز مورد نیاز است. تنظیم دوز پیشنهادی در این بیماران به صورت زیر است :

کلیرانس کراتینین ۵۰ میلی لیتر بر دقیقه یا بیشتر: نیاز به تنظیم دوز ندارد
کلیرانس کراتینین ۳۰ تا ۵۰ میلی لیتر بر دقیقه: روزانه ۵۰ میلی گرم
کلیرانس کراتینین زیر ۳۰ میلی لیتر بر دقیقه: روزانه ۲۵ میلی گرم

تنظیم دوز در نارسایی کبدی:

اطلاعاتی در شرایط نارسایی کبدی حاد در دسترس نیست . با احتیاط مصرف شود .

بارداری و شیردهی

بارداری: این دارو در رده B بارداری بوده و تنها در صورت نیاز زیر نظر پزشک مربوطه در دوران باردای مصرف شود.

شیردهی: اطلاعاتی درباره ی مصرف سیتاگلیپتین در شیردهی موجود نیست بنابراین بهتر است داروی جایگزین در نظر گرفته شود.

هشدارها و احتیاط ها :

- سابقه ی پانکراتیت یا وقوع آن پس از مصرف سیتاگلیپتین
- سنگ های صفراوی و چربی بالای خون می توانند احتمالاً بروز پانکراتیت را افزایش دهند.
- مصرف سیتاگلیپتین در بیماران دیابتی تیپ ۱ یا در درمان کتواسیدوز دیابتی توصیه نمی شود.
- نارسایی کلیوی
- واکنش های حساسیتی نسبت به سیتاگلیپتین
- مصرف همزمان سیتاگلیپتین با سایر داروهای کاهنده ی خون

عوارض جانبی:

عوارض جانبی رایج سیتاگلیپتین :

- کاهش قند خون ، سر درد ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، گلو درد ، آبریزش و احتقان بینی، درد در ناحیه زانو و بازو، استنو آرتريت
- در صورت بروز مشکلات زیر دارو را قطع و پزشک خود را مطلع سازید:
- درد شدید و پایدار در شکم، همراه با یا بدون تهوع و استفراغ می تواند نشان از شروع پانکراتیت باشد.
- واکنش آلرژیک شدید از جمله راش ، تاول، پوسته پوسته شدن و التهاب پوست به خصوص اطراف لب ها و زبان و مشکل در تنفس .

تداخلت دارویی:

- سیتاگلیپتین می تواند باعث تشدید عوارض جانبی داروهای مهارکننده ی آنزیم آنتیوتنسنین نظیر اتالاپریل شود به خصوص احتمال ادم در درمان همزمان افزایش می یابد.
- سیتاگلیپتین می تواند باعث افزایش غلظت خونی دیگوکسین شود .
- مصرف همزمان دارو های کاهنده ی قند خون با سیتاگلیپتین می تواند باعث بروز هایپوگلیسمی یا افت قند خون در بیماران شود. بنابراین در مصرف همزمان نیاز به تنظیم دوز خواهد بود.

شرایط نگهداری و بسته بندی

۳۰ قرص سیتاگلیپتین درون یک قوطی پلاستیکی بسته بندی شده است. دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید .